Травокорт® – широкий спектр противогрибковой активности[1-4]

Дерматофиты

- *Trichophyton rubrum*
- *Trichophyton mentagrophytes*
- *Microsporum gypseum*
- *Microsporum canis*
- *Trichophyton tonsurans*
- *Epidermophyton floccosum*



Дрожжи

- *Candida albicans*
- *Candida parapsilosis*
- *Candida krusei*
- *Torulopsis glabrata*



Другие

- *Malassezia spp*
- *Плесневые грибы:*
  - *Aspergillus fumigatus*
  - *Aspergillus flavus*
  - *Aspergillus niger*

- **Микозы стоп**
- **Паховая эпидермофития**
- **Кандидозные поражения кожи и неуточненные эпидермофитии**

Грибковые инфекции кожи часто сопровождаются симптомами воспаления[3,5]



Травокорт®

Данные мультицентрового исследования у 525 пациентов с микозами кожи, 12 клинических центров в Германии[5]

Травокорт® быстро устраняет зуд при микозах кожи[6]



За 1 неделю лечения у всех пациентов выраженный зуд перешел в легкий или умеренный
Через 2 недели лечения у 70% пациентов полное купирование зуда

* изоконазол
Паховая эпидермофития, n=31

Травокорт® быстро устраняет воспаление при микозах кожи



За 1 неделю лечения уменьшение эритемы у 80% пациентов

Через 2 недели лечения примерно у половины пациентов эритема исчезла, у остальных значимо уменьшилась

* изоконазол

Паховая эпидермофития, n=31

Травокорт® – тройной удар при грибковой инфекции: облегчает зуд, устраняет воспаление и подавляет инфекцию

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА Травокорт® – сокращенная версия

Регистрационное удостоверение: П N014588/01.
Действующее вещество: Дифлукортолон 0,1 % + Изоконазол 1%.
Лекарственная форма: крем для наружного применения.
Показания к применению: Поверхностные грибковые поражения кожи, сопровождающиеся выраженными воспалительными или экземоподобными симптомами.
Противопоказания: гиперчувствительность, туберкулез, сифилис и вирусные инфекции кожи, розацеа, периоральный дерматит, участки кожи с реакцией на вакцинацию, детский возраст до 2 лет, I триместр беременности.
Способ применения и дозы: 2 раза в день до 2 недель.
Побочное действие: раздражение, жжение, эритема, сухость, стрии, зуд, везикулы. При длительном применении и нанесении на большие площади возможны местные и системные реакции, характерные для кортикостероидов.
Особые указания: При присоединении вторичной бактериальной инфекции необходимо дополнительное специфическое лечение. Избегать попадания в глаза и на открытые раны. Может повреждать контрацептивные изделия из латекса.
Беременность и лактация: I триместр – противопоказан, II и III - если польза превышает риск. Не применять длительно, на большую площадь и под окклюзию. При лактации не наносить на молочные железы.
Лекарственные взаимодействия: не выявлено.
Условия отпуска из аптек: По рецепту.

Список литературы:

1. Котрехова Л.П., Михайлова М.А. Проблемы медицинской микологии. Том 9 №2.
2. Holmen K.A. Konnunen T. et al. Efficacy and tolerability of terbinafine 1% gel in patients with tinea paedis. European academy of dermatology and venerology. JEADV, 2002, 16, 81-84.
3. Carrillo J.A. et al. Chemotherapy 2001; 13(5): 555-62.
4. Carrillo-Munoz J.A. Guglietta A., Palacin C. et al. Chemotherapy 2004 Dec; 50(6): 309-13. Epub 2004 Dec. 08.
5. Schropl F. Травокорт®/Травоген® Cream. Workshop Results, June 15, 1979. Amsterdam: Excerpta Medica, 1981.
6. Veraldi S, et al. J Drugs Dermatol 2012;11(11)e70–e73.

ООО «ЛЕО Фармасьютикал Продактс»
125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2.
Тел.: +7 (495) 789-1160
info.ru@leo-pharma.com • www. leo-pharma.ru

МАТ-41594-12-2020